

PRF behandeling caudaal

pijnkliniek

Inhoudsopgave

Inleiding

Caudale epidurale injectie met PRF behandeling caudaal

De behandeling

Duur

Na de behandeling

Bijwerkingen

Napijn

Mogelijke complicaties

Resultaat

Let op!

Tot slot

Contactgegevens Pijnbestrijding



Zuyderland is een zorginstelling die zorg biedt in de gehele zorgketen (Cure en Care), wat in deze omvang uniek te noemen is.

Patiënten en cliënten zijn bij ons in vertrouwde handen, vanaf de geboorte tot aan de laatste levensfase. We zijn een service- en persoonsgerichte organisatie van hoge kwaliteit en bieden patiënten en cliënten de mogelijkheden om goed geïnformeerd mee te beslissen wat er wel en niet moet gebeuren.

Onze patiënten en cliënten krijgen volop mogelijkheden om aan te geven welke elementen zij in de zorg belangrijk vinden.



Inleiding

U heeft met uw behandelend arts afgesproken dat u in aanmerking komt voor een caudaal epidurale injectie met PRF behandeling caudaal. Ook is het mogelijk dat u deze behandeling zojuist ondergaan heeft. De arts heeft u al informatie gegeven over de behandeling. In deze folder hebben we de informatie voor u op een rijtje gezet, zodat u het nog eens rustig kunt nalezen. U kunt deze folder ook gebruiken om bijvoorbeeld uw huisarts of werkgever te informeren.

Caudale epidurale injectie met PRF behandeling caudaal

Door toediening van lokale verdoving via de epidurale ruimte bij het staartbeen (caudaal) treedt vermindering van pijn op. De epidurale ruimte strekt zich uit van de hersenen tot het stuitje. Het is een ruimte in het wervelkanaal die in dit geval wordt benaderd bij het stuitje. Bij het stuitje bevinden zich de uiteinden van de zenuwen die horen bij de rug en het onderlichaam. Door toediening van een (Pulsed) Radiofrequente (RF) stroom op dit belangrijke zenuwknoppunt worden chronische pijnklachten van het lichaam beïnvloed, zonder dat beschadiging optreedt. PRF toediening bij zenuwen is niet schadelijk en genezingsprocessen in het lichaam kunnen hierdoor positief beïnvloed worden. Bij de tot dusver behandelde patiënten blijkt vaak niet alleen de rugpijn te verminderen, maar ook pijn in andere delen van het lichaam.

De behandeling

Op de plek waar de behandeling gaat plaatsvinden wordt de huid gedesinfecteerd met chloorhexidine. U krijgt een gaasje tussen de billen zodat de chloorhexidine niet naar de anus kan sijpelen. Daarna wordt de huid bij het staartbeentje plaatselijk verdoofd. Vervolgens zal de arts met behulp van röntgendoorlichting een naaldje via het staartbeentje in de caudale ruimte brengen. Door het inspuiten van contrastvloeistof wordt de positie van het naaldje gecontroleerd. Via dit naaldje wordt enkele minuten de PRF stroom toegediend. U voelt daar meestal niets van. Aan het eind van de behandeling kan het zijn dat de arts nog een beetje verdovingsvloeistof inspuit. Dit kan een beetje vervelend aanvoelen.

Duur

Inclusief de voorbereiding en de tijd na de behandeling bent u ongeveer twee uur in het ziekenhuis. De behandeling zelf duurt ongeveer 20 minuten.

Na de behandeling

Na de behandeling verblijft u op de afdeling Dagverpleging totdat u geen last meer heeft van eventuele nawerkingen, zoals duizeligheid of een verdoofd gevoel.

Bijwerkingen

Door de lokale verdoving kan er tijdelijk een doof gevoel in het onderlichaam en slapper gevoel in de benen ontstaan. De verdoving is binnen 1 à 3 uur uitgewerkt.



Napijn

Na de behandeling kan napijn optreden die enkele dagen kan aanhouden, maar vrijwel altijd verdwijnt. U kunt hiervoor eventueel een pijnstillert innemen (bijvoorbeeld paracetamol volgens bijsluiter). Eventueel kunt u aan uw huisarts of behandelend pijnspecialist een andere pijnstillert vragen.

Mogelijke complicaties

Hoewel de arts de behandeling zeer zorgvuldig uitvoert, bestaat er bij elke behandeling een zeer geringe kans op complicaties. Dus ook bij een epidurale toediening van medicijnen. Als zeer zeldzame complicatie kan met het naaldje het ruggenmergvlies worden geraakt. Dit kan aanleiding geven tot hoofdpijnklachten. Hierover hoeft u zich niet ongerust te maken. Deze bijwerking is van tijdelijke aard en zal meestal vanzelf verdwijnen. Als dit niet het geval is, dient u contact op te nemen met uw behandelend arts, die u daarvoor kan behandelen. Verder kan er een bloeditstorting optreden in of onder de huid. Deze bloeditstorting verdwijnt vanzelf. Zeer zelden kan een infectie optreden. Een infectie moet behandeld worden.

Resultaat

Het resultaat van de behandeling is al na enkele weken te beoordelen. Het is echter goed mogelijk dat u al eerder een gunstig effect bemerkt. In een aantal gevallen zal een herhaling of een aanvullende behandeling noodzakelijk zijn.

Let op!

- Als u op het moment van het onderzoek in verwachting bent of vermoedt dit te zijn, verzoeken we u om dit vóór het onderzoek te melden.
- Als u antistollingsmiddelen (bloedverdunners) gebruikt waarvoor controle bij de trombosedienst noodzakelijk is, dient u het gebruik hiervan, in overleg met uw arts, enkele dagen voor de behandeling te stoppen. Voor de behandeling moet dan uw bloed gecontroleerd worden. De trombosedienst neemt met u contact op over de verdere dosering. Meld het gebruik van andere bloedverdunners altijd!
- Informeert u ons voor de behandeling over verandering in medicijngebruik.
- Geef altijd door als u een pacemaker, ICD of neurostimulator hebt.
- Na de behandeling is het onverantwoord dat u zelf actief aan het verkeer deelneemt. U dient er zelf voor te zorgen dat u onder begeleiding van een familielid of kennis naar huis gaat. Is er géén begeleiding, dan kan de behandeling niet door gaan. Het is de bedoeling dat u op onze afdeling wordt opgehaald.
- Als u de afgelopen 2 maanden opgenomen bent geweest in een buitenlands ziekenhuis, meldt dit dan.
- Voor deze ingreep hoeft u niet nuchter te blijven.

Tot slot

Als u nog vragen hebt, kunt u deze altijd met uw behandelend arts bespreken.

Contactgegevens Pijnbestrijding

Zuyderland Medisch Centrum Pijnbestrijding

Afspraken polikliniek



Algemeen nummer: 088-4599714

Openingstijden polikliniek

Maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur

Bezoekadres polikliniek

locatie Heerlen, BG/ Vleugel B

locatie Sittard-Geleen, Oost 13/ Eerste etage

Internetadres

www.zuyderland.nl/pijnbestrijding

